

Návod na použití: DEXERYL® krém Zdravotnický prostředek

Co DEXERYL® krém obsahuje?

Glycerol, bílý měkký parafín, tekutý parafín, glycerolmonostearát, kyselina stearová, dimethikon, makrogol 600, trolamin, akrylamid / akryloyldimethyltaurátový kopolymer, isoheksadekan, polysorbát, pentylenglykol, ethylhexylglycerin, karbomer, čištěná voda. Tuba o obsahu 250 g nebo 500 g.

Na co se DEXERYL® krém používá?

Používá se jako ochranný krém na pokožku s příznaky a projevy suché kůže (xerózy) zejména provázející různé kožní problémy (např. atopickou dermatitidu, ichtyózu...).

Jak DEXERYL® krém působí?

Složení krému DEXERYL® bylo vytvořeno za účelem zlepšit příznaky a projevy suché kůže (xerózy):

- Filmogenní účinek měkkého bílého parafínu a tekutého parafínu:
- Zabraňuje odpařování, a působí tak proti dehydrataci (ztrátě vody)
- Působí jako bariéra chránící proti vnějšímu poškození
- Hydratační účinek glycerolu navíc pomáhá udržovat vyváženou vlhkost kůže.

Díky svému složení DEXERYL® napomáhá ke zmenšení podráždění kůže a zabraňuje mu.

Jak se DEXERYL® krém používá?

Krém je určen pouze k vnějšímu použití. Na poškozenou pokožku aplikujte krém jednou či dvakrát denně v tenké vrstvě, pokud je

to nutné, aplikujte krém na postižená místa častěji, ne však více než 6krát denně. Po každém použití tubu pevně uzavřete.

Kdy se DEXERYL® krém nesmí používat?

DEXERYL® krém nepoužívejte, pokud jste na některou ze složek krému alergický/á (přecitlivělý/á).

Vzhledem k nedostatku potřebných informací se nedoporučuje používat krém společně s jinými místně aplikovanými přípravky. Máte-li nějaké pochybnosti, požádejte o radu lékaře.

Upozornění a opatření pro použití:

Neaplikujte na poraněná místa, na sliznice a do očí.

Neužívejte vnitřně.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech nežádoucích vedlejších účincích. Pokud se domníváte, že po použití tohoto přípravku došlo k závažné nežádoucí reakci, nahláste to prosím příslušnému úřadu a výrobci přípravku.

Speciální požadavky na uchování:

Uchovávejte při teplotách nižších než 30°C. Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby jeho použitelnosti uvedené na tubě. Po otevření spotřebujte do 6 měsíců. Rok přidělení CE označení: 2018. Poslední aktualizace návodu na použití: 05/2019.